

18. Liste des Antilopes d'Angola. Par J. V. BARBOZA DU BOCAGE, F.M.Z.S.

[Received June 17, 1878.]

La présente liste des espèces d'Antilopes observées en Angola a été dressée d'après les exemplaires qui existent au Muséum de Lisbonne. La plupart de ces individus ont été recueillis dans l'intérieur de Mossamedes et au Humbe, sur la rive droite du Cunene, par notre infatigable explorateur M. de Anchieta.

1. GAZELLA EUCHORE (Forst.).

Une paire d'individus adultes envoyés de Huila par M. de Anchieta. Le blanc de la tête, de l'abdomen et des membres est remplacé chez la femelle par une teinte uniforme d'un fauve-jaunâtre pâle.

2. *ÆPYCEROS PETERSI*, sp. nov.

Nous possédons également une paire d'individus adultes de cette espèce, qui nous semble nouvelle. Le mâle, que nous avons reçu d'abord, nous avait paru identique à l'*Æpyceros melampus* d'après un premier examen; mais ayant reçu plus tard la femelle, nous avons été frappé de quelques particularités de coloration qui nous semblent autoriser leur distinction spécifique. Nous commencerons donc par donner un rapide aperçu des caractères de la femelle.

Pelage d'un roux-fauve, plus pâle sur les flancs et la face externe des membres; menton, gorge, poitrine, ventre et partie interne des cuisses et de l'avant-bras d'un blanc presque pur. La tête porte sur un fond de la couleur du dos quelques marques très-caractéristiques: le dessus du chanfrein, une bande au travers de l'œil et une tache en fleur-de-lys sur le front d'un noir profond; au devant de l'œil une bande blanche bien distincte. Oreilles longues, arrondies à la pointe, d'un roux-fauve en dehors, revêtues de poils blancs en dedans, avec un espace noir à l'extrémité, plus large en dehors qu'en dedans. Queue longue, de la couleur du dos à la base, le reste blanc, marquée en dessus d'une bande longitudinale noire, à laquelle vient aboutir de chaque côté une autre bande étroite de la même couleur qui s'étend sur les fesses. Un trait noir coupant verticalement la face antérieure du genou, une tache de la même couleur à la pointe du jarret. Aux membres postérieurs, de chaque côté de l'extrémité inférieure du canon, une brosse de poils noirs. Point de mufle et point d'onglons. Deux paires de mamelles.

Dimensions.

mètre.

Du bout du museau à la base de la queue	1.30
Hauteur au garrot	0.80
Longueur de la tête	0.29
Longueur de l'oreille	0.17
Longueur de la queue	0.38

Chez notre individu mâle, plus jeune que la femelle, nous remarquons des cornes en forme de lyre fortement annelées sur leur tiers inférieur. Il présente quelques légères différences de coloration. La teinte des parties supérieures est d'un bai-roux plus foncé et le blanc des parties inférieures moins pur, plus lavé de jaune-isabelle; le dessin de la tête ressemble à celui de la femelle, quoique le noir y soit plus rembruni. Malheureusement une portion de la peau de la région frontale a été détruite par suite du coup qui l'a tué, de sorte qu'on ne peut pas constater le présence de la tache noire si nettement indiquée sur la région frontale de la femelle.

Les cornes portent trois bourrelets étroits mais saillants sur leur tiers inférieur, supérieurement elles sont lisses et arrondies; leur courbure est simple, à convexité en dehors et à pointes convergentes.

Dimensions du mâle.

mètre.

De l'extrémité du museau à la base de la queue	1·20
Hauteur au garrot	0·70
Longueur de la tête	0·25
Longueur de l'oreille	0·15
Longueur de la queue	0·35
Longueur des cornes	0·29

Le mâle nous vient de Capangombe, la femelle du Humbe, tous les deux par M. d'Anchieta¹.

3. NANOTRAGUS TRAGULUS (Forst.)?

Nous rapportons avec hésitation à cette espèce une jeune femelle que M. d'Anchieta nous a envoyée du Humbe en 1874. Voici ses principaux caractères :—

Pelage d'un roux-fauve, plus pâle sur les flancs et les membres; gorge et ventre d'un blanc pur; front et chanfrein de la couleur du dos; les Jones d'une teinte plus pâle; tour des yeux blanchâtre; une tache brune en forme de fer à cheval sur le front; une autre petite tache triangulaire brune sur le chanfrein immédiatement au-dessus du mufle, qui est petit. Oreilles très-longues, légèrement acuminées, grises en dehors, blanches en dedans avec un liséré brun sur les bords. Point de broses aux genoux; point d'onglons; queue, incomplète, de la couleur du dos. Quatre mamelles.

Dimensions.

mètre.

De l'extrémité du museau à la base de la queue	0·75
Hauteur au garrot	0·45
Longueur de la tête	0·14
„ de la l'oreille	0·11

¹ La figure qui accompagne cette note permettra de bien juger les caractères de coloration de la femelle. Notre ami le Prof. Peters, à qui nous l'avons communiquée, penche à croire, comme nous, qu'il s'agit d'une espèce nouvelle.

4. *NEOTRAGUS SALTIANUS* (Blainv.).

Des individus de Capangombe et du Humbe, sur la rive droite du Cunene, par M. d'Anchieta.

5. *CEPHALOPHUS GRIMMIUS* (Linn.).

Une paire d'individus adultes et un jeune mâle de Capangombe par M. d'Anchieta.

Il y a même au Muséum d'autres individus de cette espèce provenant d'Angola, mais dont on ignore la localité où ils auraient été pris ; quelques uns de ces individus ont vécu pendant quelques années au Jardin du Palais de Necessidades appartenant à sa Majesté le Roi Ferdinand, et s'y sont même reproduits.

Tous nos individus nous semblent appartenir par leur système de coloration à la variété dont le Dr. Gray a fait une espèce distincte sous le nom de *Grimmia splendidula* (Proc. Zool. Soc. Lond. 1871, p. 590). Nous les avons d'abord rapportés au *C. burchellii* (Journ. Acad. Sci. Lisboa, ii. p. 222).

6. *CEPHALOPHUS MONTICOLA* (Thunb.).

Deux individus, mâle et femelle, rapportés de Benguella par M. Freitas Branco ; un individu mâle envoyé de Loanda par M. Toulson.

7. *CEPHALOPHUS ANCHIETÆ*, sp. nov.

Une paire d'individus adultes et une jeune femelle capturés à Capangombe par M. d'Anchieta.

Caractères :—Brun-cendré ; les flancs, l'avant-bras et les cuisses d'une teinte plus pâle et plus cendrée ; dessus de la tête d'un cendré noirâtre, avec une touffe de poils noirs entre les cornes ; côtés de la tête et du cou de la couleur des flancs ; raie sourcilière roussâtre ; menton, gorge, poitrine, ventre et face interne des avant-bras et des cuisses d'un blanc pur ; face antérieure et externe des membres d'un cendré lavé de fauve ; queue très-courte, d'un noir profond en dessus ; la région anale de cette même couleur. Cornes effilées.

Dimensions.

mètre.

De l'extrémité du museau à la base de la queue	0·58
Longueur de la tête	0·14
Hauteur au garrot	0·33
Longeur de l'oreille	0·07
„ de la queue	0·07

La teinte générale est plus rembrunie chez la jeune femelle, les membres sont plus lavés de fauve à leur partie inférieure, le dessus de la queue et la région anale d'un brun foncé.

Nos individus doivent ressembler sans doute à *C. melanorrhous*,

Gray, de Fernão do Pó, que nous connaissons à peine d'après la planche publiée dans *Knowsley Menagerie* (Gray, Knowsl. Ménag. p. 11, pl. 10) ; ils en diffèrent cependant par le moins d'étendue du noir, qui couvre à peine le dessus de la queue et la région anale, tandis que chez le *C. melanorrhous* la croupe est aussi de cette couleur. À juger d'après les figures du Dr. Gray, cette espèce aurait une queue plus longue que la nôtre et des cornes moins effilées. Malheureusement le Dr. Gray dans ses diverses publications sur les Antilopes a presque toujours oublié de nous donner les dimensions des individus qu'il décrit.

8. CEPHALOPHUS RUFICRISTA, sp. nov.

C. longiceps, Bocage, Journ. Acad. Sci. Lisboa, ii. p. 220.

Cette espèce se trouve à peine représentée au Muséum de Lisbonne par une tête, recouverte de sa peau, envoyée en 1869 de Loanda par M. Toulson, sans s'accompagner d'aucune indication au sujet de sa provenance.

Nous avons d'abord pensé qu'elle pourrait bien être identique à *C. longiceps*, Gray, espèce établie exclusivement d'après les caractères ostéologiques d'une tête recueillie au Gabon par Du Chaillu (Proc. Zool. Soc. 1865, p. 204) ; aujourd'hui nous revenons sur nos pas, car notre première affirmative nous semble trop hasardeuse.

Le spécimen du Muséum de Lisbonne ressemble aussi par ses couleurs à la figure du *C. niger*, publiée par le Dr. Gray dans *Knowsley Menagerie*, pl. 7. Cependant, même sous ce rapport, leur identité spécifique ne nous paraît pas évidente, et à cela vient encore s'ajouter une différence sensible dans les dimensions d'après les chiffres publiés par Temminck. Nous trouvons dans les *Esquisses de Mammalogie* de cet auteur que la distance du bord antérieur de l'œil à la pointe du nez chez *C. pluto* (= *C. niger*, Gray) est de 4 pouces et 4 lignes, et en mesurant cette distance sur la tête d'Angola nous constatons qu'elle dépasse 5 pouces ; elle est de 14 centimètres.

La face supérieure de la tête est d'un brun clair sur le chanfrein et d'un brun foncé, couleur chocolat, sur le front ; les faces latérales, en haut d'un gris brunâtre, deviennent blanchâtres en se rapprochant du menton, où le blanc domine ; une raie sourcilière brun-jaunâtre ; une tache allongée de la même couleur au-dessous de l'œil se prolongeant vers le chanfrein ; tour des yeux brun-foncé ; ligne muquense légèrement courbe et horizontale. Sur le front un toupet abondant de poils bruns et d'un roux ardent, en partie couchés sur les cornes, en partie s'élevant verticalement au milieu de ces appendices ; la touffe verticale est composée de poils longs de 7 centimètres d'un roux vif, les deux touffes latérales sont formées de deux ordres de poils, les uns courts et bruns, les autres longs et roux. Les oreilles sont petites, mesurant moins de la moitié de la longueur totale de la tête ; elles sont arrondies au bout, couvertes en dehors de poils très-courts et clair-semés, nues en dedans avec une large bande marginale de poils blanchâtres. Les cornes arrondies, à peine rugueuses à la

